

কৃষি পৰামৰ্শ সেৱা বুলেটিন, অসম

(বুলেটিনত উল্লেখ কৰা পৰামৰ্শসমূহ অসমৰ বিভিন্ন AMFU ৰ দ্বাৰা প্ৰস্তুত)

বুলেটিন নং.৪৬/২০২৬

তাৰিখ: ০৯.০৬.২০২৬

বতৰৰ সতৰ্কবাণী

- **০৯ জুন** : দুই এঠাইত বিজুলী চেৰেকণিসহ বজ্ৰপাতৰ লগতে প্ৰৱলৰ পৰা অতি প্ৰৱল বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। ঠাই বিশেষে ধুমুহা বতাহ বলাৰো সম্ভাৱনা আছে, বতাহৰ সৰ্বোচ্চ গতিবেগ ৩০ৰ পৰা ৪০ কি.মি হ'ব পাৰে।
- **১০ জুন** : দুই এঠাইত বিজুলী চেৰেকণিসহ বজ্ৰপাতৰ লগতে প্ৰৱলৰ পৰা অতি প্ৰৱল বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। ঠাই বিশেষে ধুমুহা বতাহ বলাৰো সম্ভাৱনা আছে, বতাহৰ সৰ্বোচ্চ গতিবেগ ৩০ৰ পৰা ৪০ কি.মি হ'ব পাৰে।
- **১১ জুন** : দুই এঠাইত বিজুলী চেৰেকণিসহ বজ্ৰপাতৰ লগতে প্ৰৱলৰ পৰা অতি প্ৰৱল বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। ঠাই বিশেষে ধুমুহা বতাহ বলাৰো সম্ভাৱনা আছে, বতাহৰ সৰ্বোচ্চ গতিবেগ ৩০ৰ পৰা ৪০ কি.মি হ'ব পাৰে।
- **১২ জুন** : দুই এঠাইত বিজুলী চেৰেকণিসহ বজ্ৰপাতৰ লগতে প্ৰৱলৰ পৰা অতি প্ৰৱল বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে।
- **১৩ জুন** : দুই এঠাইত বিজুলী চেৰেকণিসহ বজ্ৰপাতৰ লগতে প্ৰৱলৰ পৰা অতি প্ৰৱল বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে।

ভাৰত বতৰ বিজ্ঞান বিভাগৰ শ্ৰেণীবিভাজন অনুসৰি বৰ্ধিত সময়ৰ পূৰ্বাভাস

(১২-১৮ জুন ২০২৬)

বতৰ বিজ্ঞানৰ শ্ৰেণীবিভাজন	বৰষুণ	সৰ্বোচ্চ তাপমাত্ৰা	নূন্যতম তাপমাত্ৰা
অসম আৰু মেঘালয়	স্বাভাৱিক	স্বাভাৱিকৰ ওপৰত	স্বাভাৱিকৰ ওপৰত

বতৰৰ সতৰ্কবাণীৰ সম্ভাৱ্য প্ৰভাৱ (সাধাৰণ)

- বিজুলী চেৰেকণি/বজ্ৰপাতে মুকলি পথাৰত কাম কৰা মানুহ আৰু পশুধনৰ বাবে বিপদৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে, যাৰ ফলত আঘাতপ্ৰাপ্ত বা মৃত্যুও হ'ব পাৰে। জীৱ-জন্তুবোৰক গছৰ তলত গোট খাবলৈ নিদিব। জীৱ-জন্তুবোৰক ভালদৰে চাওক আৰু ইহঁতক আপোনাৰ প্ৰত্যক্ষ নিয়ন্ত্ৰণত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক।
- দ' অঞ্চলত পানী জমা/পাহাৰীয়া অঞ্চলত ভূমিস্থলন হ'ব পাৰে।
- প্ৰৱল বৰষুণ/ধুমুহা বতাহ/ভূমিস্থলনৰ বাবে দুৰ্বল গঠনৰ ক্ষতি হোৱাৰ সম্ভাৱনা। গছৰ ডাল ভাঙি যোৱাৰ ফলত বিদ্যুৎ আৰু যোগাযোগ লাইনৰ ক্ষতি হ'ব পাৰে। পথত পানী জমা হোৱাৰ ফলত যাতায়ত সাময়িকভাৱে ব্যাঘাতপ্ৰাপ্ত হ'ব পাৰে বা যাত্ৰাৰ সময় বৃদ্ধি পাব পাৰে।
- পথত পানী জমা হোৱাৰ ফলত যাতায়ত সাময়িকভাৱে ব্যাঘাতপ্ৰাপ্ত হ'ব পাৰে বা যাত্ৰাৰ সময় বৃদ্ধি পাব পাৰে।

প্ৰভাৱ ভিত্তিক পৰামৰ্শ (সাধাৰণ)

- সকলো ট্ৰেফিক পৰামৰ্শ অনুসৰণ কৰক।
- বিজুলী চেৰেকণি/বজ্ৰপাতৰ সময়ত ঘৰতে থাকক, অতি প্ৰয়োজন নহ'লে যাত্ৰা পৰিহাৰ কৰক।
- বিজুলী চেৰেকণি/বজ্ৰপাত/ ধুমুহা বতাহ/প্ৰৱল বৰষুণ আহি থকা সময়ত পথাৰত কাম কৰা পৰিহাৰ কৰক,

সুবক্ষিত স্থানত আশ্রয় লওক। বজ্রপাতৰ সময়ত গছৰ তলত বা বিদ্যুৎ খুঁটাৰ কাষত আশ্রয় নল'ব।

- বাহনখন আচ্ছাদন থকা এলেকাত পাৰ্ক কৰক।

কৃষিৰ ওপৰত বতৰৰ সতৰ্কবাণীৰ সম্ভাৰ্য্য প্ৰভাৱ

- শস্য ঢলি পৰা (Lodging): তীব্ৰ বতাহ আৰু ধুমুহাৰ ফলত ধান, মাকৈ বা কুঁহিয়াৰৰ দৰে শস্য মাটিত ঢলি পৰিব পাৰে। ইয়াৰ ফলত শস্য চপোৱাত অসুবিধা হয় আৰু উৎপাদন হ্রাস পায়।
- ফল আৰু ফুল সৰি পৰা: প্ৰবল বতাহ/বৰষুণৰ ফলত আম বা নেমুৰ দৰে গছৰ ফুল আৰু কেঁচা ফল সৰি পৰিব পাৰে, যাৰ ফলত ব্যাপক লোকচান হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে।
- কঠীয়া বা পুলি নষ্ট হোৱা: ধাৰাসাৰ বৰষুণে নতুনকৈ সিঁচি থোৱা বীজ উটুৱাই নিব পাৰে বা নাৰ্চাৰীত থকা কুমলীয়া পুলিবোৰৰ ক্ষতি কৰিব পাৰে।
- ভূমি ক্ষয়: প্ৰবল বৰষুণে পথাৰৰ উপৰিভাগৰ সাৰুৱা মাটিখিনি ধুই নিব পাৰে, যিয়ে মাটিৰ উৰ্বৰতা শক্তি হ্রাস কৰে।
- জলমগ্নতা আৰু শিপা পচা ৰোগ: কম সময়ৰ ভিতৰত হোৱা অতিমাত্ৰা বৰষুণে পথাৰত পানী জমা কৰিব পাৰে। যদি পানী সোনকালে ওলাই নাযায়, শস্যৰ শিপাই উশাহ লবলৈ বাধা পায় আৰু ভেঁকুৰজনিত ৰোগ বা শিপা পচা ৰোগৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে।
- ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ: উচ্চ আৰ্দ্ৰতা আৰু ধুমুহাৰ ফলত গছত হোৱা আঘাতৰ সুযোগ লৈ পোক-পৰুৱা আৰু বেঞ্চেৰিয়াই শস্যৰ অনিষ্ট কৰিব পাৰে।
- পৰাগযোগত বাধা: বৰষুণ আৰু বতাহে মৌমাখিৰ দৰে পৰাগযোগকাৰী পতংগৰ কাম-কাজত ব্যাঘাত জন্মায়, যাৰ ফলত ফল-মূল আৰু শাক-পাচলিৰ বীজৰ অংকুৰণত বেয়া প্ৰভাৱ পেলায়।

কৃষি বতৰ সম্পৰ্কীয় পৰামৰ্শাৱলী

- পথাৰত যাতে পানী জমা হৈ থাকিব নোৱাৰে, তাৰ বাবে সকলো নলা-নৰ্দমা পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখক। বৰষুণে ধুই নিয়াৰ সম্ভাৱনা থকা বাবে এই সময়ছোৱাত সাৰ বা কীটনাশক প্ৰয়োগ নকৰিব।
- প্ৰবল বৰষুণৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ নতুনকৈ সিঁচা কঠীয়াতলীখন কলপাত বা খেৰেৰে ঢাকি ৰাখিবলৈ কৃষকসকলক পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে।
- যদি শস্যবোৰ পূৰ্ণ হৈছে (চপোৱাৰ উপযোগী হৈছে), তেন্তে অগ্ৰাধিকাৰ ভিত্তিত সেইবোৰ তৎক্ষণাত চপাই আনক আৰু উৎপাদিত সামগ্ৰীখিনি কোনো শুকান, চালি থকা গুদামলৈ স্থানান্তৰ কৰক।
- প্লাষ্টিকৰ শ্বীট বা অস্থায়ী জাল ব্যৱহাৰ কৰি স্পৰ্শকাতৰ নাৰ্চাৰীৰ বিচনাবোৰ ঢাকি ৰাখক যাতে ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ প্ৰত্যক্ষ প্ৰভাৱৰ পৰা পুলিবোৰ ৰক্ষা পৰে।
- বতৰৰ পূৰ্বাভাস আৰু বতৰ ভিত্তিক কৃষি পৰামৰ্শাৱলী পাবৰ বাবে কৃষকসকলক "মৌচম" এণ্ড্ৰইড এপ্লিকেচন ডাউনলোড কৰি ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হ'ল।

যোৱা চাৰিদিনত হোৱা বৰষুণৰ চমু বিৱৰণ (০৫ - ০৮ জুন ২০২৬)

ৰাজ্য	০৫-০৬-২০২৬	০৬-০৬-২০২৬	০৭-০৬-২০২৬	০৮-০৬-২০২৬
অসম আৰু মেঘালয়	প্ৰায় সকলো ঠাইত	কিছু কিছু ঠাইত	কিছু কিছু ঠাইত	বেছিভাগ ঠাইত

অহা পাঁচদিনৰ বৰষুণৰ পূৰ্বাভাস

ৰাজ্য	০৯-০৬-২০২৬	১০-০৬-২০২৬	১১-০৬-২০২৬	১২-০৬-২০২৬	১৩-০৬-২০২৬
অসম	প্ৰায় সকলো ঠাইত	প্ৰায় সকলো ঠাইত	প্ৰায় সকলো ঠাইত	প্ৰায় সকলো ঠাইত	প্ৰায় সকলো ঠাইত

শস্যৰ পৰ্যায় আৰু অসমৰ বিভিন্ন এগ্ৰ'মেট ফিল্ড ইউনিট (AMFU)ৰ দ্বাৰা জাৰি কৰা কৃষি পৰামৰ্শাৱলী

AMFU গোসাঁইগাঁও (গোৱালপাৰা, ধুবুৰী, কোকৰাঝাৰ, বঙাইগাঁও, বৰপেটা, নলবাৰী, কামৰূপ, কামৰূপ মেট্ৰ', বাকছা, চিৰাং আৰু দক্ষিণ শালমাৰা মানকাচাৰ জিলা):

- শালি ধানৰ খেতিৰ কাৰণে মূল পথাৰখন কমপক্ষে ২১ দিনমান আগতে চহাই থব লাগে যাতে খেতিত থকা ঘাঁহ বন আৰু পোক পৰুৱাবোৰ ধ্বংস বা মৰি যাব পাৰে। খেতিয়ক সকলে বৰষুণৰ পানীৰ সুবিধা লৈ শালি ধানৰ কঠীয়া তলীখনৰ প্ৰস্তুতিৰ কাম আৰু ধানৰ বীজ সিচাঁ কাম অব্যাহত ৰাখিব পাৰে। কঠীয়া তলি সদায় ওখ ঠাইত কৰিব যাতে বানপানীয়ে কঠীয়াবোৰ নষ্ট কৰি পেলাব নোৱাৰে। শালি ধানৰ ৰোৱাৰ দিন যিহেতু চমু চাপি আহি আছে সেয়েহে, শালি ধানৰ খেতিৰ বাবে কিছুমান অনুমোদিত উন্নত জাঁত যেনে- ৰঞ্জিত, বাহাদুৰ, সত্যৰঞ্জন, বসুন্ধৰা, মাচুৰী, আদি সময় থাকতে নিৰ্ভৰ যোগ্য উৎসৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰি লব পাৰে। গীতেশ, প্ৰফুল্ল আদি জাত প্ৰতিকূল পৰিস্থিতিত যেনে বানপানীৰ সময়ত খেতিত পানী জমা হৈ থকা বা খৰাং সাদৃশ পৰিস্থিতি সময়ত ৩০ৰ পৰা ৬০ বা তাতকৈয়ো বেছি দিনীয়া কঠীয়া ৰুব পৰা জাঁত। ইয়াৰ উপৰিও সঘনাই বানপানী হোৱা অঞ্চলবোৰৰ বাবে ৰঞ্জিত চাৱ-১, স্বৰ্ণ চাৱ-১ আৰু বাহাদুৰ চাৱ-১, আদি উপযোগী জাঁত।
- যিহেতু অহা পাঁচ দিনত বৰষুণৰ সম্ভাৱনা আছে সেয়েহে নাৰিকল আৰু তামোল গছত সাৰ প্ৰয়োগ বৰ্তমান স্থগিত ৰাখক। প্ৰতি বছৰে নাৰিকল আৰু তামোল গছত সাৰ প্ৰয়োগ কৰিব লাগে সেয়েহে যোৱা বছৰ বা তাৰ আগতে ৰোৱা নাৰিকল আৰু তামোল গছত সাৰ প্ৰয়োগ কৰাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা লওক। নতুনকৈ নাৰিকলৰ পুলি ৰোৱাৰ বাবে ১ মিটাৰ দৈৰ্ঘ্য, ১ মিটাৰ প্ৰস্থ আৰু ১ মিটাৰ গভীৰতাৰ গাঁতত ৫-৬ টা পাতযুক্ত নাৰিকলৰ সুস্থ-সবল পুলি ৰোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰক।
- যিহেতু অহা ৫ দিনত বতৰ ডাৱৰীয়া হৈ থকাৰ লগতে মজলীয়া ধৰণৰ বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে সেয়েহে পাণৰ খেতিডৰাত পানী জমা নহবলৈ নলা খান্দি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰক। পাণ গছৰ পাত পচা আৰু গুৰি পচা বেমাৰৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবৰ বাবে ০.৫ - ১.০ শক্তিৰ বৰডো মিশ্ৰণ বেমাৰৰ প্ৰকোপ অনুযায়ী ১৫-৩০ দিনৰ অন্তৰত ৪-৮ বাৰ জুন মাহৰ পৰা চেপ্তেম্বৰ মাহলৈকে প্ৰয়োগ কৰিব লাগে।
- যোৱা কেইসপ্তাহৰ পৰা হোৱা বৰষুণৰ ফলত মৰাপাটৰ পথাৰত পানী জমা হৈ শস্যৰ অনিষ্ট হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। ইয়াৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ পথাৰত ১০ মিটাৰ দুৰে দুৰে ২০ছে. মি. ওখ আৰু ২০ছে. মি. দ' নলা বনাই দিব লাগে যাতে অতিৰিক্ত বৰষুণৰ পানী ওলাই যায়।
- বৰ্তমান বাৰিষাৰ সময় গতিকে গৰু, ছাগলী আৰু ম'হক পানী বন্ধ হৈ থকা দ' এলেকাত থকা সেউজীয়া ঘাঁহ পোনপটীয়াকৈ খাব নিদি ভালদৰে ধুই ৰ'দত শুকুৱাই লৈ খাব দিব। এই সময়ত জীৱ জন্তুৰ অন্ত-পৰজীৱৰ (Endo parasite) বাহক শামুখৰ সৰ্বাধিক বংশবৃদ্ধি হোৱা হেতুকে চালুকীয়া পৰজীৱ (metacercari) বোৰ ঘাঁহৰ লগত লাগি থাকে সেয়েহে গৰু, ছাগলীয়ে পোনপটীয়াকৈ খালে কৃমিৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত হ'ব পাৰে। গতিকে সেউজীয়া ঘাঁহ খিনি কাটি আনি ভালদৰে ধুই ৰ'দত শুকুৱাই লৈ খাব দিব। লগতে বাৰিষাৰ আগত গৰু, ছাগলী কেইজনীক ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ লৈ কৃমিৰ ঔষধ খুৱাব।
- যিহেতু এই অঞ্চল হাঁহ পালন কৰাৰ কাৰনে উপযুক্ত সেয়েহে উচ্চ উৎপাদনক্ষম হাঁহ যেনে থাকী কেম্পবেল হাঁহ পুহিব পাৰে। থাকী কেম্পবেল হাঁহে ২০-২২ সপ্তাহ বয়সৰ পৰা কণী পৰা আৰম্ভ কৰে আৰু এই খিনি বয়সত সিহতৰ ১-১.৫ কিলোগ্ৰাম মান ওজন হয়। তেনে বয়সতে প্ৰজননৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় মতা হাঁহ (৮ জনী মাইকীৰ বিপৰীতে ১ টা মতা হাঁহ) ৰাখি বাকী মতা হাঁহবোৰ বিক্ৰী কৰি দিব পাৰি।

AMFU শোণিতপুৰ (ধেমাজি, লখিমপুৰ, দৰং, শোণিতপুৰ, ওদালগুৰি আৰু বিশ্বনাথ জিলা):

- কৃষকসকলে উচ্চ উৎপাদনক্ষম শালি ধানৰ জাতৰ বীজ প্ৰামাণিক উৎসৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰক। বৰ্তমান সময়ত অসমৰ উত্তৰ পাৰ কৃষি সংমণ্ডলৰ কৃষক সকলে শালি ধানৰ উন্নত আৰু অনুমোদিত শালি ধানৰ বিভিন্ন জাতৰ বীজসমূহ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ আঞ্চলিক কৃষি গৱেষণা কেন্দ্ৰ লখিমপুৰ, কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ লখিমপুৰ আৰু কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ শোণিতপুৰৰ লগত যোগাযোগ কৰি পাৰে।
- শালি ধানৰ অনুমোদিত উন্নত জাতসমূহ হৈছে দীৰ্ঘম্যাদি জাতসমূহ (১৫০-১৫৫ দিনীয়া) - ৰঞ্জিত, বাহাদুৰ, কুশল, পিয়লী, মাচুৰী আদি। সঘনাই বানপানী হোৱা অঞ্চলবোৰৰ বাবে অনুমোদিত জাতসমূহ (১৫০-১৫৫ দিনীয়া)- ৰঞ্জিত চাৰ-১, স্বৰ্ণ চাৰ-১ আৰু বাহাদুৰ চাৰ-১, জলশ্ৰী, জলকুৱৰী আদি।
- বানপানী হোৱা অঞ্চলত গীতেশ আৰু প্ৰফুল্ল নামৰ শালি ধানৰ জাত দুটা ওখ ঠাইত ৩০ জুনৰ ভিতৰত কঠীয়া পাৰি থোৱা থাকিলে, বানপানী ওলাই যোৱাৰ পিছত এই সঁচ কেইটাৰ কঠীয়া মূল পথাৰত গীতেশৰ ৬০ দিনীয়া আৰু প্ৰফুল্লৰ ৭৫ দিনীয়া ৰুব পাৰি। মধ্যম্যাদি জাত (১৩০-১৩৫ দিনীয়া) - সত্যৰঞ্জন, বসুন্ধৰা, স্বৰনী আদি।
- ওপৰত উল্লেখ কৰা সকলো জাতসমূহ জুন মাহৰ ভিতৰত কঠীয়াতলিত সিচি শেষ কৰক।
- শালি ধানৰ কঠীয়া তলীখন বহলে ১.২৫ মিটাৰ, দীঘলে ১০ মিটাৰ আৰু ১০ ছে:মি: ওখ হোৱা উচিত। দুখন কঠীয়াতলীৰ মাজৰ ব্যৱধান প্ৰায় ১ ফুট হ'ব লাগে। প্ৰতিখন কঠীয়া তলীত বীজ সিচাৰ আগত ২০-৩০ কি:গ্ৰাম শুকান গোবৰ, ৮০ গ্ৰাম ইউৰিয়া, ৮০ গ্ৰাম একক চুপাৰ ফচফেট আৰু ৪০ গ্ৰাম মিউৰেট অফ পটাছ ভালদৰে মাটিৰ লগত মিহলি কৰি ল'ব। ফৰকাল বতৰ চাইহে বীজ সিচা কাৰ্য্য পৰিকল্পনা কৰিব।
- যদি বৰো ধানৰ পথাৰত ধান কাটি থোৱা আছে, অনকুল বতৰ চাই মুঠিবোৰ পথাৰৰ পৰা আনি নিৰাপদ ঠাইত থোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰক। বৰো ধানৰ ধাননি পথাৰত পানী জমা হ'বলৈ নিদিব আৰু যদি জমা হৈ যায় তেতিয়া হলে তৎকালিন ভাৱে জমা হৈ থকা পানীখিনি ওলাই দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব। বৰষুণৰ পানী মূল পথাৰত থাকিবলৈ দিলে ধান পকাত সময় বেছি লাগে।
- কৃষক সকলে আদা-হালধি ৰোৱাৰ ৪০ দিনৰ পাছত বন-বাতবোৰ নিৰোৱাৰ লগে লগে গছৰ গুৰিত মাটিও চপাই দিব। আদা-হালধি খেতিদৰা ৰাইজম ৰট বেমাৰৰ পৰা বচাবলৈ খেতিদৰাত পানী জমা হ'বলৈ নিদিব আৰু বৰষুণৰ পানী ওলাই যোৱাৰ সু- ব্যৱস্থা কৰি ৰাখক।
- মে'-জুন মাহ হৈছে স্থায়ীকৈ জালুক ৰোপণ কৰিবৰ বাবে উপযুক্ত সময়। পুলিবোৰ এনেদৰে ৰুব লাগে যাতে জালুকৰ লতা বগাব পৰা আশ্ৰয়কাৰী গছৰ গুৰি আৰু পুলিটোৰ মাজৰ দূৰত্ব ৩০ চেণ্টিমিটাৰ থাকে। অনুমোদিত জাতসমূহ হ'ল- পেনিয়ুৰ-১, কল্লুভেলী, বালান কটা, কৰিমুণ্ডা, কুটান্দন, আৰকুলাম মুণ্ডা ইত্যাদি। ফৰকাল বতৰ চাইহে ৰোপণ কাৰ্য্য পৰিকল্পনা কৰিব।
- কৃষকসকলে কুঁহিয়াৰ ৰোৱাৰ ৪৫-৬০ দিনৰ ভিতৰত বন-বাতবোৰ নিৰানি কৰি গছৰ গুৰিত মাটি চপাই দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰক। তৎকালিন ভাৱে জমা হৈ থকা পানীখিনি উলিয়াই দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব। কৃষকসকলে শাক-পাচলি বাৰীখনৰ বন-বাতবোৰ নিৰানি কৰি বৰষুণৰ পানী জমা নোহোৱা সু- ব্যৱস্থা কৰি ৰাখক। গোমধানৰ পথাৰত পানী জমা হ'বলৈ নিদিব আৰু যদি জমা হৈ যায় তেতিয়া হলে তৎকালিন ভাৱে জমা হৈ থকা পানীখিনি উলিয়াই দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব।
- বৰষুণ আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে গৰুৰ চবকা ৰোগৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত হ'ব পাৰে। সেয়েহে এই সময়তেই চবকা প্ৰতিৰোধকাৰী ছিটা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰক।
- মাছ পালন কৰা খেতিয়ক সকলে পুখুৰীৰ পানী বঢ়াৰ লগে লগে মাছৰ পোনা মেলাৰ ব্যৱস্থা কৰক। পুখুৰীৰ পানীৰ অম্লতা বজাই ৰাখিবলৈ ২৫০ কেজি চূণ প্ৰতি হেক্টৰ প্ৰতি বছৰ প্ৰয়োগ কৰিব লাগে।

AMFU যোৰহাট (ডিব্ৰুগড়, তিনিচুকীয়া, যোৰহাট, গোলাঘাট, শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ আৰু মাজুলী জিলা):

শস্য	কৃষি পৰামৰ্শৱলী
শালি ধান	<ul style="list-style-type: none"> • যিহেতু অসমত ইতিমধ্যে মৌচুমী বতাহৰ আগমন ঘটিছে আৰু পথাৰত যথেষ্ট বৰষুণৰ পানী জমা হোৱা দেখা গৈছে সেয়েহে, শালিধানৰ খেতিৰ বাবে মূল পথাৰৰ প্ৰস্তুতিৰ কাম অব্যাহত ৰাখিব পাৰে। মাটি চহোৱাৰ সময়ত বিঘাই প্ৰতি ১৩ কুইণ্টল গোবৰ অথবা পচন সাৰ প্ৰয়োগ কৰি ল'ব। বৰষুণৰ পানী ধৰি ৰাখিবলৈ আলিবোৰ মেৰামতি কৰি বোকা মাটিৰে লেপি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব। • শালিধানৰ কঠীয়াতলী প্ৰস্তুতিৰ কাৰ্য্য অব্যাহত ৰাখিব পাৰে। মাটিডোখৰ বোকা কৰি মৈয়াই লোৱাৰ পিছত ১ ফুটৰ অন্তৰালত প্ৰায় ৪ ফুট বহল আৰু ৩৩ ফুট দীঘল আয়তক্ষেত্ৰৰ কঠীয়াতলী তৈয়াৰ কৰি ল'ব। এবিঘা মাটিত ধান ৰুবলৈ এনে আকৃতিৰ প্ৰায় ৬-৭ খন বীজতলীৰ প্ৰয়োজন হয় আৰু প্ৰতিখনতেই ৬৫০ গ্ৰামৰ পৰা ১ কিঃগ্ৰাঃ বীজ সিঁচিব লাগে। বীজ সিঁচাৰ পূৰ্বে প্ৰতিখন কঠীয়াতলীত ২০ কিঃগ্ৰাঃ গোবৰ অথবা পচন সাৰৰ লগতে ৮০ গ্ৰাম ইউৰীয়া, ৮০ গ্ৰাম এছঃএছঃপিঃ আৰু ৪০ গ্ৰাম এমঃঅঃপিঃ সাৰ প্ৰয়োগ কৰি লোৱাটো আৱশ্যকীয়।
অমিতা	<ul style="list-style-type: none"> • অহা ৫ দিনত মজলীয়া বৰষুণৰ সম্ভাৱনীয়তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি মূল পথাৰত অমিতা পুলি ৰোৱাৰ কাম স্থগিত ৰাখিব।
নেমু টেঙা	<ul style="list-style-type: none"> • জেকা মাটি আৰু অধিক আৰ্দ্ৰতাৰ বাবে টেঙা জাতীয় গছত 'গামোচিচ' নামৰ এবিধ বেমাৰে দেখা দিব পাৰে। নিৰাময়ৰ বাবে বাৰীখনৰ পৰা অতিৰিক্ত পানীভাগ সহজে ওলাই যোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰক। আক্ৰান্ত অংশবোৰ কটাৰীৰে চুৰুকি পটাচ পানীৰে ধুই দুই-তিনিদিন পিচত সেই অংশত বৰদ'পেস্ত সানি দিব। • নেমু টেঙা খেতিত ফলৰ ৰস শুহি খোৱা পোকৰ আক্ৰমণৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবৰ বাবে ফ্লোবেন্ডিয়ামাইড অথবা ইন্সামেক্টিন বেঞ্জোৱেত দৰৱৰ লগত ফলৰ ৰস আৰু চেনি পানী মিহলাই এটা বিষাক্ত মিশ্ৰণ তৈয়াৰ কৰি মাটিৰ খোলা পাত্ৰত ৰাখি গছজোপাৰ ডালত অথবা তাৰ আশে-পাশে পানী নপৰা নিৰাপদ স্থানত আঁৰি দিব। ফলৰ ৰসৰ গুন্ধৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈ এনে বিহ মিহলাই খোৱা খাদ্য সেৱন কৰাৰ ফলত এইবিধ পোকৰ লগতে অন্য বিভিন্ন অনিষ্টকাৰী পোক-পতংগবোৰৰ উপদ্ৰৱ যথেষ্ট পৰিমাণে হ্রাস পায়।
জাতি লাও	<ul style="list-style-type: none"> • গ্ৰীষ্ম কালীন জাতিলাওৰ খেতিৰ বাবে ওখ বালিচঁহীয়া মাটি নিৰ্বাচন কৰি চহাবলৈ আৰম্ভ কৰক। এই খেতিৰ বাবে অনুমোদিত জাতৰ বীজ যেনে, পুচা চামাৰ প্ৰলিফিক লং, পুচা চামাৰ প্ৰলিফিক ৰাউণ্ড, পুচা মেঘদুত, পুচা মানজিৰি আদি সংগ্ৰহ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰে। জুন-জুলাই মাহ গ্ৰীষ্মকালীন জাতিলাওৰ খেতি কৰাৰ বাবে উপযোগী।
মুগা পলু পালন	<ul style="list-style-type: none"> • এই সময়ত চোম গছৰ পাতৰ গ্ৰে ব্লাইট ৰোগ দেখা দিয়ে। এই ৰোগত পাতৰ কিছু অংশ ছাঁই ৰঙৰ দৰে হৈ শুকাই যায়। প্ৰথম অৱস্থাত সৰু সৰু ৰঙৰ দাগ পৰে আৰু পিছলৈ গোটেই পাতখিলাত বিয়পি পৰে। বেভিষ্টিন শতকৰা ০.১ হাৰত ১৫ দিনৰ অন্তৰে অন্তৰে ২/৩ বাৰ গছত ছটিয়াই দিলে এই ৰোগ নিৰাময় হয়।
পশু পালন	<ul style="list-style-type: none"> • বাৰিষা বতৰত পোহনীয়া গৰু, ম'হ, ছাগলী, গাহৰি ইত্যাদি আৰু ঘৰচীয়া জীৱ জন্তুবোৰক পশু চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি কৃমি ঔষধ খোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰক। ২১ দিনীয়া পোৱালী গৰু, ছাগলী, ম'হ আদিৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰতি কিঃগ্ৰাম দৈহিক ওজনৰ অনুপাতে পিপাৰজিন দৰৱৰ ১১০-১৩০ মিঃলিঃ গ্ৰাম আৰু প্ৰাপ্তবয়স্কৰ ক্ষেত্ৰত ফেবেন্দাজল দৰৱৰ ৭ মিঃলিঃ গ্ৰাম খোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিব। দৰৱ খোৱাৰ পূৰ্বে স্থানীয় পশু চিকিৎসকৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি ল'ব। • গাহৰী পালক সকলে স্থানীয় পশু চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি সময়মতে চোৱাইন ফিভাৰ বা হগ কলেৰা ৰোগৰ প্ৰতিষেধক চিতা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰক।

AMFU চিলঙী (নগাঁও, মৰিগাঁও আৰু হোজাই জিলা):

১। শালিধানৰ কঠীয়াতলী প্ৰস্তুতি:

দক্ষিণ-পশ্চিম মৌচুমী বতাহ অসমত প্ৰৱেশ কৰাৰ লগে লগে বানপানীৰ আশংকা থকা অঞ্চলসমূহত শালিধানৰ কঠীয়াতলী সাৱধানতাৰে প্ৰস্তুত কৰক। বীজতলি চাৰিওফালৰ মাটিৰ তুলনাত ১৫-২০ ছে:মি: ওখ কৰি প্ৰস্তুত কৰক যাতে অতিৰিক্ত পানীৰ ফলত কঠীয়া পঁচি নাযায়। বীজতলিত ভালদৰে পচোৱা গোবৰ বা অন্যান্য জৈৱ সাৰ প্ৰয়োগ কৰক। বানপানী সহনশীল ধানৰ জাত যেনে ৰঞ্জিত-চাব ১, স্বৰ্ণ-চাব ১ আৰু বাহাদুৰ-চাব ১ আদি ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ বিবেচনা কৰিব পাৰে। বীজ বা কঠীয়াৰ ক্ষতি হলে যাতে পুনৰ ৰোপণ কৰিব পৰা যায়, তাৰ বাবে গাঁও বা কৃষক গোটৰ মাজত সামূহিক বীজ মজুত ব্যৱস্থা ৰাখিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে।

২। ক) দক্ষিণ-পশ্চিম মৌচুমী বতাহৰ আগমনৰ ফলত হোৱা বৰষুণৰ বাবে মৰাপাটৰ পুলিবোৰ *Damping-off* (পুলি পচা) ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱাৰ আশংকা বৃদ্ধি পাব পাৰে। খেতিপথাৰত জমা হোৱা পানী তৎক্ষণাত দ' নলা কাটি উলিয়াই দিয়ক যাতে অতিৰিক্ত পানী জমা হৈ নাথাকে। মৌচুমী বৰষুণৰ পাছত ঘাঁহ-বন দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পায়, সেয়ে ৰোৱাৰ ১৫-২০ দিন পিছত প্ৰথম বনবাত চিকুনা আৰু কোৰ মৰা কাম সম্পন্ন কৰিব লাগে। পাতলীয়া বৰষুণৰ মাজতো সুযোগ পালে বনবাত চিকুনা কাম অব্যাহত ৰাখক। বীজ সিচাৰ ৪-৬ সপ্তাহ আৰু ৬-৮ সপ্তাহ পিছত নাইট্ৰ'জেন সাৰ দুটা সমান ভাগত প্ৰয়োগ কৰক।

খ) বিছা পোকৰ ব্যৱস্থাপনা: মৌচুমী বৰষুণৰ পাছত তাপমাত্ৰা আৰু আপেক্ষিক আৰ্দ্ৰতা বৃদ্ধি পোৱাৰ ফলত মৰাপাটত বিছা পোকৰ উপদ্ৰৱ বৃদ্ধি পাব পাৰে। পাতৰ ওপৰ ভাগত কণী আৰু নতুন পলু থুপ খাই থকা দেখা যাব পাৰে। সেয়ে নিয়মিত ক্ষেত পৰ্যবেক্ষণ কৰি উপদ্ৰৱৰ প্ৰাথমিক লক্ষণ সোনকালে চিনাক্ত কৰাটো অতি প্ৰয়োজনীয়। কণী বা নতুন পলুৰ থুপ দেখা গ'লে আক্ৰান্ত কুমলীয়া পাতবোৰ সংগ্ৰহ কৰি নষ্ট কৰক, যাতে পোকৰ বিস্তাৰ ৰোধ কৰিব পৰা যায়।

৩। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌচুমী বতাহৰ আগমনৰ লগে লগে হোৱা বৰষুণৰ ফলত পূৰ্ণ মণ্ড মাহৰ চেই (pod) ফাটি গুটি সৰি যোৱাৰ আশংকা থাকে। সেয়ে পূৰ্ণ চেইসমূহ অধিক দেৰি নকৰি অণতি পলমে ছিঙাৰ ব্যৱস্থা কৰক। যদি চেই বা গুটি বৰষুণত অধিক ভিজি থাকে, তেন্তে তৎক্ষণাত প্ৰথৰ ৰ'দত শুকুৱাব নালাগে; প্ৰথমে ছাঁয়াত শুকুৱাই ওপৰৰ অতিৰিক্ত পানী আঁতৰাব লাগে। তাৰ পিছত ভালদৰে শুকুৱাই সংৰক্ষণ কৰক। বীজ হিচাপে ৰাখিবলগীয়া গুটিসমূহ বিশেষভাৱে ভালকৈ শুকোৱাটো জৰুৰী, নহ'লে সংৰক্ষণকালত বিভিন্ন পোক-পতংগ আৰু বেমাৰৰ আক্ৰমণত নষ্ট হ'ব পাৰে। সঁচৰ বাবে সংৰক্ষণ উপযোগী কৰিবলৈ গুটিৰ আৰ্দ্ৰতা ৯-১০ শতাংশলৈ নামি অহালৈকে শুকুৱাব লাগে।

৪। খাৰিফ মাকৈ: বৰ্তমান পাতলীয়া বৰষুণৰ বাবে মাটিৰ আৰ্দ্ৰতা বীজৰোপনৰ বাবে উপযুক্ত। ভাল নিষ্কাশন থকা মাটিত বীজৰোপন কৰক আৰু ৬০ ছেমি পৰিসৰত শাৰী অনুযায়ী বীজ বোৱাওক। নিৰ্দেশিত হাইব্ৰিডৰ প্ৰমাণিত বীজ ব্যৱহাৰ কৰক। পানী জমা হোৱা ঠাইত বীজৰোপন নকৰিব।

৫। ১) কৃষকসকলে অহা ৫ দিনত ৰহৰ মাহ(টি-২১)ৰ বীজৰোপন অব্যাহত ৰাখিব পাৰিব। বৰ্তমানৰ পাতলীয়া বৰষুণৰ বতৰ বীজ অংকুৰণৰ বাবে উপযুক্ত।

২) পানী জমা হোৱা নোহোৱা ভাল নিকাশ ব্যৱস্থা অথকা মাটি বাছনি কৰক। দ' চানেকীয়া অঞ্চলৰ বাবে ওখ মাটিৰ ভেটি ব্যৱহাৰ কৰি ৰহৰ মাহৰ খেতি কৰিব পাৰি। ৰহৰ মাহৰ বীজৰ বাবে ১২-১৫ কেজি/হেক্টৰ বীজ ব্যৱহাৰ কৰক। শাৰী-শাৰী দূৰত্ব ৬০ ছেমি আৰু গছ-গছ দূৰত্ব ২০ ছেমি ৰখা উচিত।

৬। জুন মাহলৈকে ওখ পানী জমা নোহোৱা মাটিত অমিতাৰ পুলি ৰোপণ কৰিব পৰা যায়। বৰ্তমানৰ পাতলীয়া বৰষুণ ৰোপণৰ বাবে অনুকূল। পৰামৰ্শযোগ্য জাতসমূহ হৈছে: ৰাঁচি, ৰাছিংটন, হাফলং, কোৰ্গ হানিডিউ।

৭। পশুপালন পৰামৰ্শ: বৰষুণৰ সময়ত পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে পুষ্টিকৰ খাদ্যৰ ব্যৱস্থা কৰক আৰু নেপিয়াৰ, পাৰা, গিনি, ছেটেৰিয়া, কঙ' ছিগনেল আদি সেউজীয়া ঘাঁহ ওখ মাটিত ৰোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰক। পৰিষ্কাৰ আৰু বিশুদ্ধ পানী পশুৰ বাবে যোগান ধৰক। গৰম আৰু আৰ্দ্ৰতাকালত ভাইৰেল আৰু বেক্টেৰিয়াজনিত ৰোগ যেনে এফ

এম ডি, এইচ এছ, বি সি কিউ, এছ এফ, ইটি আদিৰ টিকা দিয়ক।

৮। বৰ্তমান উষ্ণ আৰু মধ্যম আৰ্দ্ৰতাৰ সময়ছোৱাত কামৰূপা, বনৰজা, আৰু ৰেইনব'ৰ ষ্টাৰ আদি উন্নত জাতৰ মুগী পালন কৰক, যিয়ে ভাল কণী উৎপাদন কৰে। বৰষুণ আৰু তাপমাত্ৰা পৰিৱৰ্তনৰ পৰা চৰাইসমূহক ৰক্ষা কৰিবলৈ উপযুক্ত চালি দিয়ক। স্বাস্থ্য ভাল ৰাখিবলৈ পৰিষ্কাৰ পানী আৰু সুস্বাদু আহাৰ যোগান ধৰক।

AMFU ডিফু (ডিমা হাচাও, কাৰ্বি আংলং আৰু পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলা):

শস্য	শস্য বিশেষ পৰামৰ্শৱলী
কুঁহিয়াৰ	যিহেতু কুঁহিয়াৰ গছ বৰ্তমান মুখ্য বৃদ্ধিৰ (Grand Growth / Elongation Phase) পৰ্যায়ত আছে। কুঁহিয়াৰ খেতিৰ বাবে পৰ্যাপ্ত আৰ্দ্ৰতাৰ প্ৰয়োজন, কিন্তু পথাৰত পানী জমা হ'লে এই ফচলবিধৰ বিস্তৰ ক্ষতি হ'ব পাৰে। সেয়েহে, কুঁহিয়াৰ পথাৰৰ পৰা অতিৰিক্ত বৰষুণৰ পানী উলিয়াই দিবলৈ খেতিয়কসকলক পানী ওলাই যোৱা নলাৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে।
চয়াবীন	কৃষকসকলক পথাৰত ছয়াবীনৰ বীজ সিঁচিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে, কিয়নো মে' মাহৰ মাজভাগৰ পৰা জুন মাহৰ মাজভাগলৈ ছয়াবীন সিঁচাৰ আটাইতকৈ উত্তম সময়। ভাল উৎপাদন পাবলৈ আপোনাক মাটিখিনি খুব মিহি আৰু ভালদৰে গুড়ি কৰি লৈ এখন সুন্দৰ খেতিৰ বাবে উপযোগী ভেটি তৈয়াৰ কৰিবলৈ কোৱা হৈছে। ইয়াৰ বাবে প্ৰথমে মাটিডোখৰ দকৈ হাল বাই ল'ব লাগে আৰু তাৰ পিছত মৈ দি মাটিৰ চপৰাবোৰ ভাঙি সমান কৰি ল'ব লাগে। ইয়াৰ উপৰিও, পথাৰত যাতে অতিৰিক্ত বৰষুণৰ পানী জমা হৈ নাথাকে সহজে ওলাই যাব পাৰে, তাৰ বাবে অলপ ঢাল ৰাখি কম গভীৰ পৃষ্ঠীয় নলা তৈয়াৰ কৰাটো নিশ্চিত কৰিব। ছয়াবীনৰ বীজবোৰ ৪৫ চেণ্টিমিটাৰ দূৰত্বত শাৰী শাৰীকৈ সিঁচিব লাগে আৰু এটা বীজৰ পৰা আনটো বীজৰ দূৰত্ব ৫ ৰ পৰা ১০ চেণ্টিমিটাৰ হ'ব লাগে। বীজ সিঁচাৰ গভীৰতা ৪ চেণ্টিমিটাৰতকৈ বেছি হ'ব নালাগে। যদি মাটিত পানীৰ পৰিমাণ বা জীপ বেছি থাকে, তেন্তে গভীৰতা আৰু কমাই ২ ৰ পৰা ৩ চেণ্টিমিটাৰ কৰিব পাৰি। বীজবোৰ যাতে ভালদৰে গজে, তাৰ বাবে শাৰীবোৰ ধান খেৰৰ এটা পাতল তৰপেৰে ঢাকি দিব লাগে।
বহৰ ৰঙামছুৰ	পথাৰত অৰহৰ (বহৰ মাহ) বীজ সিঁচাৰ বাবে জুনৰ পৰা জুলাই মাহ আটাইতকৈ উত্তম সময়। ভাল উৎপাদন পাবলৈ উন্নত জাতৰ যেনে— 'টি-২১' (T-21) ৰ দৰে অধিক উৎপাদনক্ষম বীজ সংগ্ৰহ কৰাৰ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে। মাটিখিনি ভালদৰে প্ৰস্তুত কৰিবলৈ পথাৰখন ৩ ৰ পৰা ৫ বাৰ হাল বাই ল'ব, মাটিডোখৰ সমান কৰিব আৰু সকলো অপতৃণ (বন-বাত) আঁতৰাই পেলাব। খেতি কৰিবৰ বাবে প্ৰতি বিঘা মাটিত ১.৬ ৰ পৰা ২.০ কিলোগ্ৰাম (অথবা প্ৰতি হেক্টৰত ১২ ৰ পৰা ১৫ কিলোগ্ৰাম) বীজৰ প্ৰয়োজন হ'ব। বীজ সিঁচাৰ সময়ত কেৱল ফৰকাল বতৰতহে শাৰীবোৰৰ মাজত ৭৫ চেণ্টিমিটাৰ আৰু এটা পুলিৰ পৰা আনটো পুলিৰ মাজত ৩০ চেণ্টিমিটাৰ দূৰত্ব ৰখাটো নিশ্চিত কৰিব।






পশু সম্পত্তি	পশু সম্পত্তি বিশেষ পৰামৰ্শৱলী
গাই	গাখীৰ উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধিৰ বাবে খীৰতী গাই বা দুগ্ধজাত পশুবোৰক সুস্বাদু আহাৰ (balanced feed) দিব লাগে। ইয়াৰ উপৰিও পশুবোৰক জুকাৰ গুৰু (deworming) খুৱাব লাগে। মাকৈ, বহুবৰ্ষজীৱী ঘাঁহ (perennial grasses) আৰু অন্যান্য ঘাঁহজাতীয় শস্যবোৰ এই সময়তে কাটি ল'ব লাগে। এই সময়ছোৱাত অত্যধিক গৰমৰ বাবে পশুবোৰৰ গাত দেখা দিব পৰা ৰোগসমূহ হৈছে— জ্বৰ, জলবিয়োজন (শৰীৰত পানীৰ পৰিমাণ কমি যোৱা), শৰীৰৰ নিমখ বা লৱণ হ্রাস পোৱা, ভোক হেৰুওৱা আৰু উৎপাদন ক্ষমতা কমি যোৱা।

পলট্রি	পলট্রি বিশেষ পৰামৰ্শৱলী
চৰাই	কুকুৰাবোৰক ৰাণীকেত (ৰানিষ্কেত), মাৰেক্স ৰোগ (Marek's disease) আৰু কুকুৰা বসন্ত (Fowl pox) ৰোগৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিষেধক টিকাকৰণ কৰাব লাগে। ককচিডিঅ'চিচ (Coccidiosis), গাম্বুৰু (Gamburu) আদি ৰোগ প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ পামখনত পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্ন পৰিৱেশ বজাই ৰাখিব লাগে। কুকুৰাৰ আহাৰ হঠাতে সলনি কৰিলে ক্ষতি হ'ব পাৰে। লগতে, কুকুৰাৰ থকা ঠাইৰ মজিয়াত পৰা তুঁহ বা খেৰৰ লেটাৰখিনি (Litter) সদায় শুকান কৰি ৰাখিব লাগে।






AMFU কৰিমগঞ্জ (কাচাৰ, কৰিমগঞ্জ/শ্ৰী ভূমি আৰু হাইলাকান্দি):

শস্য/ পশু/মাছ	পৰ্যায়	পৰামৰ্শসমূহ
শালি ধান	ৰপন	আবহাওৱাৰ পূৰ্বাভাস ও সতৰ্কবাৰ্তা অনুযায়ী, আগামী দিনগুলিতে মাঝাৰি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। আবহাওৱাৰ উন্নতি না হওয়া পর্যন্ত কৃষকদের চাৰাগাছে শালি ধানের বীজ বপন স্থগিত রাখাৰ পৰামৰ্শ দেওয়া হছে। যেসব চাৰাগাছে ইতোমধ্যে শালি ধানের বীজ বপন কৰা হয়েছে, সেখানে জলাবদ্ধতা এবং চাৰাৰ ক্ষতি ৰোধ কৰাৰ জন্য যথাযথ নিষ্কাশন ব্যৱস্থা বজায় ৰাখতে হবে। চাৰাৰ সুস্থ বৃদ্ধি নিশ্চিত কৰতে এবং অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের কারণে ক্ষতি কমাতে চাৰাগাছ নিয়মিত পৰ্যবেক্ষণ কৰাৰও পৰামৰ্শ দেওয়া হছে।
শালি ধান		যেহেতু বৰাক উপত্যকাৰ জেলাগুলি নিচু এবং বন্যাপ্ৰবণ এলাকা, তাই কৃষকদের আসাম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ জেডআৰএস বা কেভিকে থেকে ৰঞ্জিত সাব-১, বাহাদুৰ সাব-১ এবং স্বৰ্ণা সাব-১-এৰ মতো উচ্চ ফলনশীল ও জলমগ্নতা সহনশীল ধানের জাতের বীজ সংগ্ৰহ কৰে সেই অনুযায়ী চাৰাগাছ প্ৰস্তুত কৰাৰ পৰামৰ্শ দেওয়া হছে।
শালি ধান	জমি প্ৰস্তুতি	এই সপ্তাহে মাঝাৰি বৃষ্টিপাতের পূৰ্বাভাস থাকায়, কৃষকদের শালি ধান চাষের জন্য জমি তৈরিৰ মূল কাজ চালিয়ে যেতে এবং বৃষ্টিৰ পানি কাৰ্যকৰণৰে ধৰে রাখাৰ জন্য জমিৰ আইল মজবুত কৰাৰ পৰামৰ্শ দেওয়া হছে। আইলৈৰ সঠিক ৰক্ষণাবেক্ষণ মাটিৰ আৰ্দ্ৰতা সংৰক্ষণে সাহায্য কৰবে এবং পৰবৰ্তী ফসলৈৰ পৰিচৰ্যাৰ জন্য পৰ্যাপ্ত পানিৰ জোগান নিশ্চিত কৰবে।
মাছ		মাছ চাষিদের নিৰ্ভৰযোগ্য উৎস থেকে সুস্থ পোনা সংগ্ৰহ কৰাৰ পৰামৰ্শ দেওয়া হছে, কারণ মাছের পুকুৰে পৰ্যাপ্ত জল রয়েছে। পুকুৰে নতুন পোনা ছাড়াৰ আগে বাৰবাৰ জাল ফেলে অবাঞ্ছিত মাছ ও শিকাৰি প্ৰাণী সৰিয়ে ফেলুন। মাছের পালানো ৰোধ কৰতে পুকুৰের চাৰপাশ জাল দিয়ে ঘিৰে সুৰক্ষিত কৰাৰ জন্যও মাছ চাষিদের পৰামৰ্শ দেওয়া হছে।
গৰু		এই সপ্তাহে বৃষ্টিপাত ও বজ্ৰঝড়ের পূৰ্বাভাস থাকায় পশুপালকদের তাদের পশুদের গোয়ালঘৰে রাখাৰ এবং দিনের বেলায় খোলা মাঠে চৰা থেকে বিৰত রাখাৰ পৰামৰ্শ দেওয়া হছে। পশুদের সুস্থ ৰাখতে পালনকাৰীৰা দানাদাৰ খাদ্য ও সবুজ ঘাসের সাথে ৩০ গ্ৰাম আয়োডিনযুক্ত লবণ সৰবৰাহ কৰতে পাৰেন।
পাখি		পাখিদের সঠিক পুষ্টি নিশ্চিত কৰতে, সুস্বাস্থ্য বজায় ৰাখতে এবং সৰ্বোত্তম উৎপাদন অৰ্জনের জন্য প্ৰয়োজনীয় খনিজ, ভিটামিন ও অ্যামিনো অ্যাসিড সমৃদ্ধ একটি সুস্বাদু খাদ্য সৰবৰাহ কৰা উচিত।

আগলুক ৫ দিনৰ বাবে জিলা পৰ্যায়ৰ বৰষুণৰ পূৰ্বাভাস জাৰি কৰিছে RMC গুৱাহাটীয়ে



আগলুক ৫ দিনৰ বাবে জিলা পৰ্যায়ৰ বতৰৰ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে RMC গুৱাহাটীয়ে



শ্রীভূমি	বতৰৰ আগজাননী	প্ৰায় সকলো ঠাইতে বিজুলী ঢেৰেকণি সহ বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে	প্ৰায় সকলো ঠাইতে বিজুলী ঢেৰেকণি সহ বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে	বেছিভাগ ঠাইতে বিজুলী ঢেৰেকণি সহ বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।	বেছিভাগ ঠাইতে বিজুলী ঢেৰেকণি সহ বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।	বেছিভাগ ঠাইতে বিজুলী ঢেৰেকণি সহ বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
	সতৰ্কতা	দুই এঠাইত বিজুলী ঢেৰেকণি সহ ব্ৰজপাতৰ সৈতে প্ৰবলৰ পৰা অতি প্ৰবল বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । ঠাই বিশেষে বতাহ বলাবোৰো সম্ভাৱনা আছে , বতাহৰ সৰ্বোচ্চ গতিবেগ ৩০ কিঃমিঃ পৰা ৪০ কিঃমিঃ হব পাৰে ।	দুই এঠাইত বিজুলী ঢেৰেকণি সহ ব্ৰজপাত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে	দুই এঠাইত বিজুলী ঢেৰেকণি সহ ব্ৰজপাত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে	সতৰ্কবাণী নাই	সতৰ্কবাণী নাই

****পূৰ্বানুমান আৰু সতৰ্কতা পুৱা ৮:৩০ ৰ পৰা পৰৱৰ্তী ২৪ ঘণ্টাৰ বাবে****

WARNING	Probabilistic Forecast		Probability of Occurrence(%)
	Terms		
WARNING (Take Action)	Unlikely		<25
ALERT (Be prepared to take action)	Likely		25-50
WATCH (Be Updated)	Very Likely		50-75
No Warning (No Action)	Most Likely		>75